

## Ensayos Clínicos 2018

| Protocolo                                     | Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Especialidad |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REBOOT-CNIC                                   | Tratamiento con betabloqueantes tras infarto de miocardio sin fracción de eyección reducida                                                                                                                                                                                                             | CARDIOLOGÍA  |
| IHTDES-2018-01<br><b>CERRADO</b>              | Estudio con tomografía de coherencia óptica a 9 meses en stent farmacológico de polímero abluminal bioestable y sirolimus                                                                                                                                                                               | CARDIOLOGÍA  |
| ICICOR-2017-01                                | Beneficio del bloqueo del sistema renina-angiotensina sobre la evolución clínica y el remodelado ventricular tras la colocación de una prótesis percutánea aórtica                                                                                                                                      | CARDIOLOGÍA  |
| D419CC00002                                   | Ensayo fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico de durvalumab y tremelimumab como tratamiento en primera línea en pacientes con carcinoma hepatocelular irresecable                                                                                                                               | DIGESTIVO    |
| CECUM                                         | Eficacia de los bolos intravenosos de corticoides más tratamiento con corticoides orales en comparación con corticoides orales en monoterapia para el tratamiento de la colitis ulcerosa moderada: ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado                                                          | DIGESTIVO    |
| CNT01275CRD3007<br>(SEAVUE)<br><b>CERRADO</b> | Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, ciego y controlado con fármaco activo para comparar la eficacia y seguridad de ustekinumab frente a adalimumab en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Crohn con actividad moderada o grave previamente no tratados con fármacos biológicos | DIGESTIVO    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I6T-MC-AMAN<br><b>CERRADO</b>    | Estudio de inducción en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo sobre mirikizumab en pacientes con fracaso convencional y biológico con colitis ulcerosa activa de moderada a grave                          | DIGESTIVO      |
| I6T-MC-AMBG<br><b>CERRADO</b>    | Estudio de mantenimiento en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo sobre mirikizumab en pacientes con colitis ulcerosa activa a moderada a grave                                                             | DIGESTIVO      |
| SIMBA -16                        | Simvastatina en la prevención de pancreatitis aguda recurrente: ensayo clínico aleatorizado triple ciego controlado con placebo                                                                                                                                       | DIGESTIVO      |
| 2017-004299-69<br><b>CERRADO</b> | Ensayo clínico de bajo nivel de intervención, abierto y multicentrico para evaluar el efecto de alirocumab sobre el volumen, la arquitectura y la composición de la placa aterosclerotica en pacientes con hipercolesterolemia familiar del registro safeheart.       | ENDOCRINOLOGÍA |
| GEM-KYCYDEX                      | Ensayo clinico de fase II aleatorizado y controlado ,carfilzomib y dexametasona en combinacion con ciclofosfamida vs. carfilzomib y dexametasona en pacientes con mieloma multiple en recaida/refractario                                                             | HEMATOLOGÍA    |
| GELLC-7                          | Estudio multicéntrico, no aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y seguridad de ibrutinib seguido por consolidación con ofatumumab, en pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) o linfoma linfocitico de células pequeñas(II) sin tratamiento previo | HEMATOLOGÍA    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PCYC-1141-CA                       | Un estudio multicentrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de fase 3 del inhibidor de tirosina kinasa de bruton (btk) ibrutinib, en combinacion con rituximab en comparacion con placebo en combinacion con rituximab en sujetos sin tratamiento previo con linfoma folicular                              | HEMATOLOGÍA   |
| GEM-SELIBORDARA                    | Ensayo abierto,multicéntrico, de fase 2 de selinexor (KPT-330), bortezomib y dosis baja de dexametasona más daratumumab (SELIBORDARA) para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída y/o refractario.                                                                                                      | HEMATOLOGÍA   |
| ALLSCTped2012FORUM                 | Trasplante alogénico de células madre en niños y adolescentes con leucemia linfoblástica aguda-forum                                                                                                                                                                                                                         | HEMATOLOGÍA   |
| SIMPLIFY                           | Ensayo clinico aleatorizado, multicentrico, abierto, controlado en fase iii, para demostrar la no inferioridad del tratamiento antibiotico dirigido de espectro reducido frente al tratamiento de amplio espectro con un betalactamico antipseudomonico en el tratamiento de pacientes con bacteremia por enterobacteriaceae | MICROBIOLOGÍA |
| ALXN1210aHUS-311<br><b>CERRADO</b> | Estudio de grupo unico de alxn1210 en pacientes adultos y adolescentes con sindrome hemolitico uremico atipico (shua) sintratamiento previo con inhibidores del complemento                                                                                                                                                  | NEFROLOGIA    |
| MN39158<br><b>CERRADO</b>          | Estudio de extension multicentrico abierto de un solo grupo para evaluar la efectividad y la seguridad de ocrelizumab en pacientes con esclerosis multiple incluidos previamente en un ensayo clinico de fase iib/iv de ocrelizumab patrocinado por f. hoffmann-la roche                                                     | NEUROCIENCIAS |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| MK-3475-590<br><b>CERRADO</b>                 | Ensayo Clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, de pembrolizumab (mk-3475), en combinación con cisplatino y 5- fluoracilo frente a placebo en combinación con cisplatino y 5 fluoracilo como tratamiento en primera línea en sujetos con carcinoma esofágico avanzado/metastásico | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| SOGUG-2016-A-IEC(PRO)-12<br><b>CERRADO</b>    | Ensayo fase II para evaluar el tratamiento de mantenimiento con olaparib en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPMRC) después de haber alcanzado una respuesta parcial o enfermedad estable durante el tratamiento con docetaxsel.                                          | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| GINECO-<br>OV236B/GEICO1701<br><b>CERRADO</b> | Estudio aleatorizado, doble ciego y fase III de atezolizumab frente a placebo en pacientes con recidiva tardía de cáncer epitelial de ovario de trompa de falopio o peritoneal tratado con quimioterapia basada en plantionio y bevacizumab                                                                       | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| THOMAS_ GECP17/04                             | Ensayo Clínico fase II, para evaluar la efectividad de tipifartinib en pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico avanzado escamoso con mutación haras                                                                                                                                                      | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| MK-3475-811                                   | Ensayo de fase III, aleatorizado y doble ciego para comparar trastuzumab más quimioterapia y pembrolizumab con trastuzumab más quimioterapia y placebo como tratamiento de primera línea en participantes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado con HER2 positivo (KEYNOTE 811)      | ONCOLOGÍA MÉDICA |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TTD-18-01                            | Estudio de fase III, aleatorizado, secuencial y abierto, para evaluar la eficacia de FOLFOX + panitumumab seguido por FOLFIRI + bevacizumab (Secuencia 1) frente a FOLFOX + bevacizumab seguido por FOLFIRI + panitumumab (Secuencia 2) en pacientes con cáncer colorrectal metastásico no resecable, RAS nativo, tumor primario en lado izquierdo, no tratado previamente: CR-SEQUENCE | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| MK-3475-782<br><b>CERRADO</b>        | Ensayo de fase II para investigar los marcadores genéticos de respuesta al pembrolizumab (MK-3475, SCH 900475) combinado con quimioterapia como tratamiento de primera línea para el cáncer de pulmón no microcítico.                                                                                                                                                                   | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| GEICAM/2016-03_LARGO<br>SEGUIMIENTO  | Estudio de largo seguimiento de pacientes con cáncer de mama incluidos en estudios en estadios precoces del grupo GEICAM.                                                                                                                                                                                                                                                               | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| MK-3475-859                          | Estudio Clínico de fase III, aleatorizado y doble ciego de pembrolizumab (mk-3475) + quimioterapia en comparación con placebo + quimioterapia como tratamiento de primera línea en participantes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica y irresecable o metastásico, sin tratamiento previo y con her 2 negativo                                                     | ONCOLOGÍA MÉDICA |
| ACP-103-035                          | Estudio abierto de extensión de 52 semanas de pimavanserina para el tratamiento complementario de la esquizofrenia                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALUD MENTAL     |
| TREATMENT-PATIENTS<br><b>CERRADO</b> | Alteraciones metabólicas asociadas al tratamiento farmacológico de la esquizofrenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SALUD MENTAL     |

D419JC00001

Ensayo mundial fase III aleatorizado  
abierto multicentrico de durvalumab y el  
bacilo de calmette- guerin(bcg)  
administrados como terapia combinada  
en comparacion con bcg en monoterapia,  
en pacientes con cáncer de vejiga no  
musculo invasivo de alto riesgo sin  
tratamiento previo con bcg (POTOMAC)

UROLOGIA